

UNIRIO

PROCESSO SELETIVO DISCENTE

RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL
EM SAÚDE

2015

ENFERMAGEM

**UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
ESTADO
DO
RIO DE JANEIRO**

HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
GAFFRÉE E GUINLE
(HUGG)

CENTRO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS E DA
SAÚDE (CCBS)

1) “Operando com o princípio da transversalidade, o HumanizaSUS lança mão de ferramentas e dispositivos para consolidar redes, vínculos e corresponsabilização entre usuários, trabalhadores e gestores.”

In Saúde e Trabalho, Série F, Comunicação e Educação em Saúde, 2011. Brasília-DF
http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_saude_trabalho.pdf

Considerando o contexto da Política Nacional de Humanização, analise as seguintes assertivas sobre as transições epidemiológica, demográfica e nutricional no Brasil.

- I) Os saberes técnico-científicos assumem uma centralidade excludente de qualquer outro tipo de *discursividade* no encontro assistencial.
- II) Por ser baseada em finalidades instrumentais, aponta a necessidade da existência de assimetria de poder entre os papéis do profissional de saúde e dos usuários, cabendo a este último um lugar subordinado.
- III) Há a proposição que o enfoque instrumental do encontro assistencial seja incorporado em um enfoque hermenêutico, de forma que, no cuidado, ocorra uma fusão de horizontes entre profissionais de saúde e de usuários.
- IV) O enfoque das propostas está dirigido essencialmente para a atenção básica de saúde.
- V) Não estão previstas recomendações para os serviços de saúde que operam com alta densidade tecnológica.

É (são) **VERDADEIRA(S)** a(s) assertiva(s)

- a) III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) I, II, III, IV e V.

2) Pode-se afirmar que a organização de uma linha de cuidado

- a) pressupõe problematização permanente do processo de trabalho.
- b) é centrada exclusivamente na racionalidade biomédica.
- c) baseia-se no enfoque normativo do planejamento.
- d) define-se através do consenso de especialistas.
- e) deve ter âmbito protocolar.

3) O artigo 200, da Constituição Federal de 1988, em seu inciso III, atribui ao SUS a competência de ordenar a formação na área da Saúde (BRASIL, 1988). Nesse processo de formação, o atendimento se faz, corretamente, quando

- I) opera a interlocução entre os segmentos da formação, da atenção, da gestão e do controle social.
- II) preconiza a utilização de instrumentos avaliativos externos.
- III) busca evitar a explicitação dos diferentes pontos de vistas.
- IV) pretende ser mais técnica, evitando o caráter político.
- V) tem caráter prescritivo.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) assertiva(s)

- a) I, II, III, IV e V.
- b) I, II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, apenas.
- e) III, apenas.

4) A assertiva que apresenta característica(s) fundamental(ais) **CORRETA(S)** a ser(em) ressaltada(s) do trabalho em saúde é a seguinte:

- a) É de verticalização.
- b) É de objetivação plena.
- c) São ações decorrentes de procedimentos técnicos.
- d) É um trabalho sempre controlado.
- e) É um trabalho vivo e em ato.

5) Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs) no Brasil, pode-se afirmar que

- a) têm organização piramidal.
- b) estão em permanente constituição.
- c) estão centradas na Rede de Atenção Hospitalar.
- d) são estruturadas da mesma forma em todo o país.
- e) não apresentam pontos de cruzamento entre si.

6) São situações desejáveis para que o princípio da integralidade seja contemplado em uma unidade hospitalar, **EXCETO**:

- a) Democratização nas relações de trabalho.
- b) Trabalho interdisciplinar e multiprofissional.
- c) Gestão corporativa.
- d) Fóruns de Educação Permanente.
- e) Inclusão dos usuários do serviço e de seus familiares na construção de projetos terapêuticos singulares.

7) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. No Capítulo II, Seção I Das Regiões de Saúde o Art. 4 determina que as Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais.

A opção que considera, **CORRETAMENTE**, essa normativa é a seguinte:

- a) Não são recomendadas Regiões Interestaduais de Saúde.
- b) Cada Região de Saúde deve ter no mínimo, ações e serviços de Urgência, Emergência e Atenção Primária.
- c) A definição da Região de Saúde é competência exclusiva do Secretário Estadual de Saúde.
- d) Será observado cronograma pactuado nas Comissões Intergestores.
- e) As Comissões Tripartites não participam nas pactuações das diretrizes gerais.

8) São atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**:

- a) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- b) Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.
- c) Priorizar ações focalizadas visando à estabilidade social.
- d) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- e) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

9) São propostas aprovadas na XIV Conferência Nacional de Saúde (2011):

- I) Criar e desenvolver uma Política Nacional de Seguridade Social, articulando e formando um amplo conjunto de direitos sociais em um sistema de proteção social universal e equânime.
- II) Instituir, por meio de parcerias entre Ministérios da Educação e da Saúde, nas disciplinas apropriadas, conteúdos curriculares relacionados com as políticas públicas, SUS, cidadania, participação da comunidade, controle social, educação em saúde, entre outros, nos currículos escolares de ensinos fundamental e médio e na grade curricular dos cursos de graduação de universidades públicas e privadas.
- III) Fomentar o protagonismo dos movimentos sociais e dos usuários do SUS, implementando processos de educação popular em saúde.
- IV) Alcançar um mínimo de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a saúde, garantindo o investimento público.
- V) Garantir que a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as esferas de gestão e em todos os serviços, seja 100% público e estatal e submetido ao controle social.

Estão **CORRETAS** as assertivas

- a) I e III, apenas.
- b) II, III e IV, apenas.
- c) I, II, III e IV, apenas.
- d) I, III, IV e V, apenas.
- e) I, II, III, IV e V.

10) A qualificação da Rede Cegonha no país pode contribuir diretamente para diminuir

- I) a mortalidade Materna no país.
- II) a mortalidade Pós-Neonatal no país.
- III) a natimortalidade por Sífilis Congênita no país.
- IV) a mortalidade por Prematuridade no país.
- V) o índice de cesarianas que não tenham indicação clínica.

Estão **CORRETAS** as assertivas

- a) I, II e IV, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) I, II, III e V, apenas.
- d) I, III, IV e V, apenas.
- e) I, II, III, IV e V.

11) Os enfermeiros exercem papel importante na promoção e no alívio da dor por meio de medidas físicas, cognitivas e comportamentais. Mesmo com esta importante participação, a intervenção farmacológica ainda é a estratégia mais utilizada para aliviar a dor em clientes. Em geral, o método de analgesia ideal deve permitir que um nível sérico adequado da medicação seja alcançado e mantido de forma rápida. O medicamento considerado como **NÃO** opioide é

- a) Morfina.
- b) Fentanil.
- c) Indometacina.
- d) Meperidina.
- e) Metadona.

12) O tipo de anestesia em que o anestésico local é injetado dentro do espaço intratecal é chamado de

- a) anestesia geral.
- b) anestesia espinal.
- c) anestesia regional.
- d) anestesia epidural.
- e) anestesia por bloqueio de nervo periférico.

13) Os dados obtidos com a ausculta cuidadosa e completa do coração são essenciais no planejamento e na avaliação do cuidado dos pacientes criticamente doentes. Um som patológico, de baixa frequência, que ocorre durante a fase de enchimento rápido inicial da diástole ventricular, que, devido ao ventrículo insuficiente que não consegue distender-se para aceitar este influxo rápido de sangue, gerando por sua vez um fluxo turbulento resultando na vibração das estruturas valvares átrio-ventriculares ou dos próprios ventrículos, é chamado de

- a) terceira bulha cardíaca.
- b) primeira bulha cardíaca.
- c) segunda bulha cardíaca.
- d) quarta bulha cardíaca.
- e) sopro cardíaco.

14) As úlceras crônicas na perna de etiologia vasculogênica constituem um problema grave e de abrangência mundial, sendo responsáveis por índices de morbidade e mortalidade significativos, além de provocarem considerável impacto econômico. Constituem-se características **APENAS** de uma úlcera venosa em membro inferior.

- a) Tem profundidade superficial e com leito pálido.
- b) Apresenta exsudato em pouca quantidade e possui evolução lenta.
- c) Provoca dor pouca ou moderada e, em geral, tem um tamanho pequeno.
- d) Em geral, o pulso pedioso em indivíduos com úlcera venosa está ausente ou diminuído e edema presente.
- e) Em geral, localiza-se no terço inferior da perna/maléolo medial e possui exsudato de moderado a excessivo.

15) A única afirmação **INCORRETA** em relação às formas farmacêuticas dos medicamentos é a seguinte:

- a) Formas líquidas de medicamentos do tipo solução aquosa são substâncias dissolvidas em água e xarope.
- b) Em medicamentos para administração por via tópica, a pasta é considerada um tipo de pomada espessa que é absorvida através da pele mais lentamente do que a pomada (unguento ou creme).
- c) O pó são partículas estéreis de medicação que são dissolvidas em um líquido (água ou salina normal) antes da administração.
- d) O Aerosol é uma preparação medicamentosa aquosa borrifada e absorvida na boca e nas vias respiratórias superiores não designada para ingestão.
- e) Preparações orais sólidas com liberação contínua são comprimidos ou cápsulas que se dissolvem na boca para liberar a medicação, não designado para ingestão.

16) Foram prescritos ticarcilina/clavulanato 50mg/Kg a cada 4h para uma criança de 5 anos que pesa 18Kg. Existem frascos de ticarcilina/clavulanato de 200mg/ml de solução salina normal. O volume a ser administrado para atender ao prescrito é igual a

- a) 4,5.
- b) 5,5.
- c) 4,25.
- d) 4,75.
- e) 5,0.

17) Em uma pessoa com lesão cerebral, uma pupila não dilatada e não reativa unilateral súbita é um mau sinal. Quando o aumento da pressão intracraniana empurra o tronco cerebral para baixo (herniação uncinal), há uma pressão em um nervo craniano, causando dilatação da pupila. O nervo envolvido neste processo é o

- a) Óptico.
- b) Hipoglosso.
- c) Oculomotor.
- d) Troclear.
- e) Trigêmio.

18) O Choque é uma das complicações cirúrgicas mais comuns. O(s) tipo(s) de choque(s) mais comum(ns) em grandes cirurgias é (são) conhecido (s) como

- a) Hipovolêmico e séptico.
- b) Cardiogênico.
- c) Séptico.
- d) Neurogênico.
- e) Hipovolêmico.

19) Em clientes na situação de recuperação pós-anestésica, a resposta mais adequada para a maior preocupação que os enfermeiros devem ter é com situações de

- a) Demora da recuperação da consciência.
- b) Não recobrar a consciência e queda na PA.
- c) Hipotensão e impregnação.
- d) Obnubiliação.
- e) Impregnação.

20) A palpação do tórax tem por objetivo avaliar as paredes do tórax, sua sensibilidade, elasticidade, expansibilidade e as vibrações ou frêmitos emitidos pela fala. Na avaliação da elasticidade torácica, a manobra onde o enfermeiro coloca uma das mãos na parede posterior do tórax e, ao mesmo tempo, a outra na parte anterior, solicitando posteriormente que o cliente respire profundamente pela boca é conhecida como Manobra de

- a) Lasègue.
- b) Ruault.
- c) Smith-bates.
- d) Leopold.
- e) Rovsing.

21) A avaliação do enfermeiro no momento da transfusão de sangue é importante, haja vista a quantidade de diferentes componentes que podem ser infundidos. Dentre estes componentes, a indicação para o uso de um concentrado de plaquetas se dá com o objetivo de

- a) melhora de quadros de infecção grave.
- b) manutenção de uma oxigenação adequada.
- c) correção do déficit de fatores de coagulação VIII, XIII e fibrinogênio.
- d) melhora do desvio à esquerda presente no resultado laboratorial.
- e) prevenção ou resolução de hemorragia em trombocitopênicos.

22) Constituem-se respostas avaliadas na Escala de Coma de Glasgow

- a) pressão arterial, pressão venosa e nível de consciência.
- b) avaliação verbal, nível de consciência e pressão arterial.
- c) temperatura, pressão, pulso e respiração.
- d) ocular, verbal e motora.
- e) temperatura, pressão e pulso.

23) A colocação de um paciente internado em UTI na posição prona, ou decúbito ventral, é um procedimento barato e inofensivo. Entretanto, deve ser realizado por equipe multiprofissional experiente. A posição prona é indicada para

- a) Instabilidade hemodinâmica refratária ao uso de drogas vasoativas.
- b) Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo.
- c) Monitorização intracraniana.
- d) Trauma torácico.
- e) Lesão Medular.

24) A epidemiologia tem contribuído de forma consistente para a obtenção de respostas a perguntas e a indagações relacionadas a diversos problemas de saúde. Quantificar ou medir a frequência com que estes problemas ocorrem na população é um dos objetivos da Epidemiologia. Sendo assim, o conceito epidemiológico fundamental que expressa o número de casos existentes de uma doença, em um dado momento, é denominada

- a) Incidência.
- b) Sobrevida.
- c) Consistência.
- d) Prevalência.
- e) Taxa de mortalidade.

25) A excreção renal do volume de líquido corporal, assim como dos solutos, é necessária para que o corpo permaneça em homeostase. Diversos hormônios regulam a reabsorção tubular renal de diversos eletrólitos e água. O hormônio responsável por aumentar a reabsorção de sódio e água em nível tubular e aquele responsável por aumentar a reabsorção de sódio e a secreção de potássio, respectivamente, são

- a) Peptídeo Natriurético Atrial e Hormônio Antidiurético.
- b) Hormônio Antidiurético e Aldosterona.
- c) Aldosterona e Hormônio Antidiurético.
- d) Paratormônio e Angiotensina II.
- e) Angiotensina II e Aldosterona.

26) Os medicamentos inotrópicos são usados para aumentar a força de contração miocárdica e o débito cardíaco. O medicamento que pode ser classificado como inotrópico é

- a) Enalapril.
- b) Tenecteplase.
- c) Atorvastatina.
- d) Dobutamina.
- e) Nitroprussiato de Sódio.

27) O sinal comum na hipercalemia é

- a) Onda T invertida.
- b) Intervalo PR encurtado.
- c) Onda T elevada, em tenda e um intervalo PR prolongado.
- d) Complexo QRS sem alteração.
- e) Bradicardia sinusal.

28) Os aspectos clínicos principais da cetoacidose diabética são

- a) Hipoglicemia e Perda eletrolítica.
- b) Hiperglicemia e Alcalose.
- c) Desidratação e Alcalose.
- d) Hipoglicemia e Acidose.
- e) Hiperglicemia e Acidose.

29) As infecções oportunistas são doenças que se aproveitam da fraqueza do sistema imunológico, como ocorre em indivíduos com HIV/AIDS. A infecção oportunista comum em pessoas com AIDS é

- a) Sarcoma de Kaposi.
- b) Hepatite C.
- c) Leptospirose.
- d) Hepatite B.
- e) Artrite reumatoide.

30) Com base nas recomendações da *American Heart Association* (AHA), de 2010, a frequência das compressões torácicas devem ser

- a) a compressão torácica não deve ser interrompida.
- b) de, aproximadamente, 80 por minuto.
- c) de, no mínimo, 80 por minuto.
- d) de, aproximadamente, 100 por minuto.
- e) de, no mínimo, 100 por minuto.

31) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (RESOLUÇÃO COFEN 311/2007) determina aos profissionais de enfermagem em relação a DIREITOS, RESPONSABILIDADES E DEVERES e Proibições. Um direito desses profissionais em relação às ORGANIZAÇÕES EMPREGADORAS é

- a) estimular, propiciar aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de Enfermagem sob sua orientação e sua supervisão.
- b) registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.
- c) recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica.
- d) delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde, que não seja enfermeiro.
- e) atender às normas vigentes para a pesquisa, envolvendo seres humanos, segundo a especificidade da investigação.

32) Ao tratar das Infrações e Penalidades, O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (RESOLUÇÃO COFEN 311/2007) determina que a gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências e as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. Entre as penalidades previstas no Código, a mais alta penalidade é a

- a) multa.
- b) censura.
- c) advertência verbal.
- d) cassação do direito ao exercício profissional.
- e) suspensão do exercício profissional.

33) Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, é **CORRETO** afirmar que

- a) O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.
- b) Quando o processo de enfermagem é realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, ele corresponde ao, usualmente, denominado nesses ambientes de Consulta de Rotina.
- c) Fica sob responsabilidade do Técnico de Enfermagem juntamente com o enfermeiro, a liderança na execução e na avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados.
- d) A coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença.
- e) O processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes: 1-Coleta de dados de Enfermagem, 2-Histórico de Enfermagem, 3-Consulta de Enfermagem, 4-Prescrição de Enfermagem e 5-Evolução.

34) No conjunto de medidas determinadas pela NORMA REGULAMENTADORA 32 - NR 32 “SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE”, está prevista a reavaliação regular do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. Essa deve ocorrer no seguinte período:

- a) 2 vezes ao ano.
- b) 1 vez ao ano.
- c) a cada 2 anos.
- d) a cada 3 anos.
- e) a cada 5 anos.

35) Numa organização, o fator que **NÃO** se caracteriza como da cultura organizacional que interfere nas tomadas de decisão ética, é conhecido como

- a) objetivos.
- b) normas.
- c) rituais.
- d) circunstâncias.
- e) maneiras de resolver problemas.

36) A osteoporose vem despontando nas últimas décadas como um importante problema de saúde pública, principalmente, em mulheres. A informação prestada pelo enfermeiro que **NÃO** contribui na educação às mulheres é

- a) a prática de atividade física inibe a absorção de cálcio.
- b) a exposição ao sol (antes das 10 horas e após as 16 horas) ativa a pró-vitamina D.
- c) o consumo excessivo de sódio e de carnes vermelhas está relacionado ao maior risco de osteoporose.
- d) os nutrientes mais diretamente associados com a prevenção da perda óssea são o cálcio e a vitamina D.
- e) os adultos devem ser incentivados ao consumo do leite e de seus derivados desnatados, para não excederem o consumo de gordura animal.

37) Aumentar a correta utilização de métodos anticoncepcionais seguros é ainda um grande desafio para o Sistema Único de Saúde, à Mulher no Climatério. O método que **NÃO** se define como um método de barreira é

- a) Camisinha feminina.
- b) Diafragma.
- c) Camisinha Masculina ou preservativo.
- d) Espermicidas.
- e) Tabela (Ogyno-Knauss).

38) Nas lesões de pele, a indicação correta dos produtos ou coberturas é fundamental para o alcance dos melhores resultados. Assim, pelo acompanhamento diário da lesão, o enfermeiro pode sugerir e adotar alguns dos produtos abaixo. É **INCORRETA** a seguinte indicação:

- a) O polivinilpirrolidona-iodo a 10% é indicado para antisepsia da pele íntegra, antes de procedimentos invasivos.
- b) O Digluconato de clorexidina é indicado na antisepsia prévia à inserção de sítio de dispositivos vasculares e no banho do cliente queimado.
- c) O açúcar é indicado para feridas infectadas e exudativas, podendo permanecer por 24 horas.
- d) Os ácidos graxos essenciais podem ser utilizados como hidratante para a pele íntegra e para prevenção de úlceras por pressão.
- e) A papaína é indicada para o tratamento de feridas abertas com moderada ou grande quantidade de exudato e quando se deseja o debridamento de tecido necrótico.

39) Das reações abaixo, aquela que **NÃO** se caracteriza como reação alérgica moderada a medicamentos é

- a) erupção cutânea.
- b) prurido.
- c) rinite.
- d) anafilaxia.
- e) urticária.

40) A medição da glicemia foi bastante facilitada pela difusão de aparelhos portáteis. Indivíduos portadores de distúrbios glicêmicos podem rápida e facilmente tomar uma amostra de sangue por punção digital e com uso de fitas descartáveis monitorarem com boa segurança os valores normais da glicose que, em adultos, em jejum, estão na faixa entre

- a) 60-95 mg/100 ml
- b) 70-105 mg/100 ml
- c) 100-150 mg/100 ml
- d) 90-100 mg/100 ml
- e) 100-120 mg/100 ml

41) Apesar do grande desenvolvimento dos procedimentos cirúrgicos, muitos pacientes evidenciam o diagnóstico de medo relacionado ao déficit de conhecimento e à experiência cirúrgica prévia. O enfermeiro pode atribuir este diagnóstico na presença das seguintes características definidoras colhidas de uma senhora de 65 anos em internação pré-cirúrgica eletiva:

- a) Medo do desconhecido
- b) Frequência cardíaca aumentada
- c) Fé em Deus como provedor da cura
- d) Apreensão em relação à anestesia
- e) Dor pós-operatória

42) A infusão venosa periférica é um procedimento frequentemente utilizado para pacientes internados. Contudo, este procedimento requer alguns cuidados no seu acompanhamento. Com vistas a monitorar as possíveis complicações, o enfermeiro deve instituir para estes pacientes o seguinte procedimento:

- a) Verificação de pressão arterial
- b) Suspender a alimentação por via oral
- c) Verificação do pulso
- d) Pesar o paciente
- e) Ausculta pulmonar

43) A coleta de dados e a formulação de diagnósticos de enfermagem demarca uma área de atuação própria e independente da profissão. Um dos modelos que vem se difundindo amplamente pelo mundo é a Taxonomia da *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA). Sobre as metas da coleta de dados, a sentença que **NÃO** condiz com este sistema é a seguinte:

- a) O enfermeiro deve focalizar os dados necessários à identificação das respostas e às experiências humanas.
- b) Por ser uma área de atuação exclusiva do enfermeiro, a coleta de dados não pode se utilizar de informações e de registros feitos por outros profissionais nem dados obtidos de membros da família do paciente.
- c) Ter os achados baseados em pesquisas e outras evidências.
- d) As hipóteses diagnósticas são analisadas ao longo do processo de coleta de dados e utilizadas junto com um guia formal de coleta de dados para a geração dos dados necessários aos diagnósticos.
- e) Em uma coleta completa, os diagnósticos somente são concluídos quando as hipóteses terminam. A investigação de cada padrão informa o enfermeiro e o paciente sobre as hipóteses diagnósticas.

44) A Enfermagem no Brasil é exercida por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, nos termos da Lei 7498/86. À categoria de auxiliar de enfermagem **NÃO** cabe(m) a(s) seguinte(s) atividade(s):

- a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- b) executar ações de tratamento simples.
- c) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.
- d) participar da equipe de saúde.
- e) participar da programação da assistência de enfermagem.

45) As úlceras por pressão são um grande problema a ser enfrentado pelos enfermeiros. A Escala de Braden é um instrumento para avaliação preditiva do risco destas lesões. O elemento que **NÃO** se caracteriza como escala de Braden é

- a) a capacidade do paciente de mudar de posição do corpo e controlá-la.
- b) o grau em que a pele do paciente é exposta à umidade.
- c) o padrão habitual de consumo de alimentos.
- d) o grau de atividade física do paciente.
- e) a idade do paciente.

46) A sífilis congênita é uma doença de fácil prevenção, mediante o acesso precoce à testagem durante o pré-natal e o tratamento adequado das gestantes positivas, incluindo o tratamento do parceiro. Entre 2005 e junho de 2012, foram notificados no Sinan 57.700 casos de sífilis em gestantes, o que impõe a todos os profissionais de saúde o dever de conhecer e de difundir conhecimentos corretos sobre esta doença. É **INCORRETO** afirmar que

- a) Todas as mulheres que manifestem a intenção de engravidar devem fazer o teste VDRL.
- b) Além do homem, os cães são reservatórios viáveis e transmissores do *Treponema pallidum*.
- c) A sífilis congênita é consequente à infecção do feto pelo *Treponema pallidum*, por via placentária, em qualquer momento da gestação.
- d) Na sífilis adquirida, o período de incubação é de cerca de 21 dias, a partir do contato sexual infectante.
- e) A criança com sífilis congênita ao nascimento pode já se encontrar gravemente enferma ou com manifestações clínicas menos intensas, ou até aparentemente saudável, vindo a manifestar sinais da doença mais tardiamente, meses ou anos depois, quando sequelas graves e irreversíveis ter-se-ão instalado.

47) Para estabelecer um campo próprio no mundo científico, a enfermagem desenvolveu algumas teorias que buscam compreender a natureza da enfermagem e explicá-la. A **CORRETA** relação entre as teorias e suas autoras é

- a) Cuidado Transcultural –Madeleine Leininger
- b) Cuidado Transpessoal – Jean Watson
- c) Teoria Ambiental – Dorothea Orem
- d) Teoria da Adaptação – Calista Roy
- e) Teoria das Relações Interpessoais – Hildegard Peplau

48) Com o objetivo de abordar corretamente o problema da transmissão de microorganismos, os equipamentos hospitalares foram agrupados em três categorias para esterilização, desinfecção e limpeza. A **CORRETA** relação entre os equipamentos e sua classificação é a seguinte:

- a) Roupa de cama – não crítico
- b) Cateter visical – crítico
- c) Endoscópio – semicrítico
- d) Comadre - crítico
- e) Cânula endotraqueal –semicrítico

49) A medida da pressão arterial é uma ação de grande importância para a avaliação dos pacientes sob cuidados de saúde. A **FRASE INCORRETA** sobre as medidas da pressão arterial é

- a) O aumento da atividade resulta em uma elevação proporcional da pressão arterial.
- b) Ocorre normalmente uma elevação gradual ao longo da infância e da idade adulta.
- c) Após a puberdade, as mulheres apresentam geralmente uma pressão arterial menor que seus parceiros masculinos.
- d) O ritmo circadiano faz com que a pressão arterial seja maior pela manhã e diminua com avanço do dia.
- e) A pressão arterial é mais elevada nas pessoas obesas do que nas pessoas de mesma idade com peso normal (inclusive adolescentes).

50) A respiração é um processo vital que merece atenção e correta avaliação pelo enfermeiro. Há descrição **INCORRETA** DOS PADRÕES respiratórios na seguinte opção:

- a) Hiperventilação - Aumento na frequência e na profundidade da respiração.
- b) Bradpneia - Respiração lenta. Frequência reduzida ou irregular.
- c) Taquipneia - Respiração rápida e irregular.
- d) Hipoventilação - Respiração superficial e irregular.
- e) Respiração de Cheyne-Stokes - As respirações diminuem gradualmente tendendo a apneia.